

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2001 г. № 189

г. Сухум

О ходе выполнения Постановления Кабинета Министров от 26.09.2000 г. № 316 “О состоянии и мерах улучшения деятельности фтизиатрической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

Рассмотрев справку Министерства здравоохранения Республики Абхазия «О ходе выполнения Постановления Кабинета Министров от 26.09.2000г. № 316 “О состоянии и мерах улучшения деятельности фтизиатрической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия».

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Справку Министерства здравоохранения Республики Абхазия “О ходе выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 26.09.2000г. № 316 “О состоянии и мерах улучшения деятельности фтизиатрической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия ” приять к сведению (прилагается).

2. Отметить значительную организационную работу, проведенную Министерством здравоохранения Республики Абхазия, его органами и учреждениями на местах по выявлению и привлечению к амбулаторному и стационарному обследованию и лечению лиц, страдающих туберкулезом.

3. Поручить Министерству здравоохранения Республики Абхазия продолжить активную работу, направленную на вовлечение общелечебной сети и стационаризованной фтизиатрической службы, совместно с гуманитарной миссией МСФ “Врачи без границ” по профилактике и снижению уровня заболеваемости туберкулезом в республике.

4. Отметить недостаточную работу глав администраций районов республики по восстановлению фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских местностях, являющихся первичными звеньями здравоохранения на местах.

Премьер-министр
Республики Абхазия



А. Джергения

СПРАВКА

О ходе выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 сентября 2000г. № 316 "О состоянии и мерах улучшения деятельности фтизиатрической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

После принятия указанного постановления Кабинетом Министров Республики Абхазия . Министерством здравоохранения Республики Абхазия. органами и учреждениями здравоохранения на местах была проведена определенная работа.

Министерством здравоохранения Республики Абхазия была разработана и принята "Целевая программа по снижению заболеваемости туберкулезом среди населения республики", а еще раньше, в 1998 г. "Целевая программа по снижению туберкулеза среди детского населения Республики Абхазия".

Основной целью обеих программ является уменьшение резервуара туб.инфекции среди населения республики.

При этом предусматривалось решение следующих задач:

1. Обеспечить охват профилактическими осмотрами 70% населения, в том числе методом флюорографии.

2. Добиться 100% госпитализации больных с открытой формой туберкулеза, т.е. ВК-выделителей, и их длительное лечение.

3. Добиться проведения углубленного обследования больных и контактных членов семей, особенно детей, проведение курсов профилактического лечения.

4. Добиться 100% БЦЖ-ирования новорожденных, проведение ревакцинации согласно карты проф.прививок.

5. Добиться 100% охвата туберкулинодиагностикой детского населения с последующим обследованием Манту-положительных детей, взятием их на учет и проведением лечения.

6. Организовать лабораторное обследование мокроты больных культуральным и бактериологическим методами.

7. Обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами и лабораторными реактивами, рентгеншленками.

8. Открыть стационар закрытого типа для лечения больных туберкулезом при учреждениях уголовно-исправительной системы, а также лиц, уклоняющихся от лечения.

9. Повысить эффективность лечения до 80-90%.

10. Совершенствовать пути медико-социальной реабилитации больных и лиц ставших инвалидами вследствие перенесенного туберкулеза.

11. Систематически проводить санитарно-просветительскую работу на телевидении, по радио, прессе.

По штату на 1.9.2001г. по Абхазии положено:

- врачебных должностей - 18.5;
- занято - 14.5;
- вакантны - 4;
- физических лиц - 9;
- совместители- 5.5.

Из них по районам:

- г.Сухум - положено - 14.5;
- занято - 12.5;
- вакантные - 2;
- физических лиц - 7;
- совместители 6.5.

в том числе Республиканский тубдиспансер положено 13 врачебных должностей:

- занято – 13;
- вакантные –
- физических лиц – 5;
- совместители – 8.

По г.Ткуарчал:

- положено - I врач. должность;
- занято - I врач. должность;

По Гулрышшскому району:

- положено - I врач. должность;
- занято - I врач. должность;

По г.Гагра:

- положено - 2 врач. должности;
- вакантн. - 2 врач. должности.

По г.Гал - ставка фтизиатра не предусмотрена.

По г.Очамчыра - ставка не предусмотрена.

По Гудаутскому району ставка не предусмотрена.

Для активного выявления туберкулеза проводились систематические беседы на телевидении, радио, в печати, демонстрировались фильмы, что значительно увеличило обращаемость за специализированной медицинской помощью в головном учреждении - Республиканском противотуберкулезном диспансере, расположенном в п. Гулрышш и рассчитанном на одновременное лечение 150 больных.

На содержание диспансера со штатом 42,5 ед., в том числе 13 врачей различных специальностей, выделено 643700 руб., в том числе на заработную плату сотрудников 240600 руб., питание – 336000 руб., приобретение мед. оборудования и мягкого инвентаря – 12000 руб.

Персонал получает повышенные должностные оклады, организован бесплатный проезд сотрудников к месту работы и домой. Имеются 2 микроавтобуса.

В диспансере налажен круглосуточный врачебный контроль дежурных врачей, консультации необходимых специалистов.

Основные показатели по стационару:

	1998г.	1999г.	2000г.
Занятость койки	138.8	190	217
Среднее пребывание на койке	104.9	281.4	210
Оборот койки	1.3	0.7	0.9
Летальность	5.3	4.5	7.6

Эффективность лечения, проводимого при содействии МСФ, т.е. закрытие полостей распада и абациллирование, составляет 80%, через 6-8 месяцев лечения 4-5 спецпрепаратами на фоне витаминотерапии у первичных больных и около 40% у хроников.

Профилактическое флюорографическое обследование органов грудной клетки, а также мокроты на ВК у больных с хроническими заболеваниями легких при обращении их к фтизиатрам и терапевтам общей лечебной сети в случаях отсутствия фтизиатров в районах.

Представлены данные по годовым отчетам:

1998 г. - 10112	в т.ч. подростки – 987
1999 г. - 11611	- 1100
2000 г. - 5352	- 583
+ 310 заключ.	

За 6 месяцев 2001 выявлено 86 случая туберкулеза.

Принято фтизиатрами больных:

1998 г. - 2479 чел.

1999 г. - 3118 чел.

2000 г. - 3386 чел.

Выявлено первичных больных:

1998 - 112 чел.

1999г. 150 чел.

2000 г. 178 чел.

Контингент взрослых туббольных:

Всего:	ВК+	ВК -	фибро-н/в	С
1999 г. – 340 чел	95	255	36	59
2000 г. 213 чел.	143	70	64	99
2001 г. 6 месяцев				

В Гулдаутском и Очамчирском районах в 2000 г. отмечалось по I случаю туб.менингита.

Таким образом, отмечается общее уменьшение количества больных получавших стационарное лечение, но увеличение количества ВК- выделителей - за счет улучшения лабораторной диагностики в РПТД, проводимой под контролем высококвалифицированных врачей-лаборантов МСФ, а также привлечению к исследованию мокроты пациентов, обращающихся к врачам общей лечебной сети с жалобами на длительный кашель.

Начато в 2001г. стационарное лечение по программе ДОТС МСФ больных туберкулезом легких заключенных в ИВС и СИЗО МВД Республики Абхазия лечатся около 40 человек, предусмотрено также исследование мокроты на ВК у всех заключенных, отбывающих наказание в указанных учреждениях МВД Республики Абхазия.

По предварительным данным среди этого контингента большинство пациентов имеют ВК, устойчивые к основным медикаментам и поэтому трудно поддающиеся лечению.

В связи с проводимой работой по выявлению туберкулеза улучшению лабораторной диагностики с использованием культуральных методов определения чувствительности ВК к медикаментам, выявлено определенное количество больных, ВК у которых резистентны к 2-3 основным препаратам и для их лечения необходимы дорогостоящие препараты II ряда.

По ходатайству Министерства здравоохранения Республики Абхазия МСФ в настоящее время проводит лечение всех больных туберкулезом независимо от ВК-выделения контактных детей до 12 лет, а также ведет подготовительную работу по лечению больных: с резистентными формами ВК, в основном хроников, для чего будет открыто специальное отделение. Минздравом Республики Абхазия дополнительно выделено 16,5 единиц в РПТД, на сегодняшний день лечатся 4 таких больных, к концу года, по мере получения результатов по определению резистентности, количество их увеличится.

В г. Сухум в течение 2001г. было проведено флюорографические обследования легких организованного контингента населения, согласно спискам, представленным руководителями учреждений.

Всего обследовано 1400 человек. Туберкулез выявлен в 65 случаях, туберкулез СЧ -3.

Однако массовые ФЛГ- обследование населения затруднено в связи с отсутствием передвижного флюорографа, частыми поломками старой аппаратуры, дефицитом запчастей, а также дороговизной флюорографических пленок. Поэтому на ближайший период основным методом выявления туберкулеза остается лабораторное исследование мокроты на ВК, осуществляемое в Гудрышском тубдиспансере не только

стационарным больным, но и амбулаторным: забор мокроты осуществляется при выездах в районы республики по направлению врачей общей лечебной сети, которые также ведут учет больных туберкулезом и наблюдение за ними, в случае отсутствия фтизиатров по штату.

В плане осуществления целевой программы по детству была продолжена постановка пробы Манту среди детского населения, данные о которых представлены в таблице № I

	Кол-во Манту			БЦЖ			Б-ных и нужд:		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000
Всего	21881	17884	16010	6606	8337	4745	548	652	532

Продолжалось дообследование детей с пробой Манту свыше 10 мм, фтизиатрами детской поликлиники и тубдиспансера амбулаторно в стационаре, так и на местах при выездах в районы.

Все нуждающиеся в лечении после дообследования получали бесплатно курсы химиопрофилактического лечения изониазидом на фоне витаминотерапии в возрастных дозах амбулаторно в том числе по программе МСФ в 1999г. - 86, 2000г. - 206 детей.

Выявлено и пролечено амбулаторно 3-4 спешпрепаратами первичных больных детей и подростков с диагнозом туберкулез б/п л/узлов.

1998 г. - 60 чел.

1999 г. - 22 чел.

2000г. - 9 чел.

за 6 месяцев 2001г. не выявлено больных.

Противорезивное лечение продолжительностью по 3 мес. весной и осенью получили в 2000г. - 88 детей.

За период 1998-2000г. в стационаре РПТД в Гулрыпше получили лечение дети и подростки с диагнозами:

	1998-99гг.	2000г.	2001г.
Туберкулез б/п л/узлов	87	3	1
Туберкулез костей	3	-	-
т-з мiliaryный	2	-	-
Диссеминированный	1	-	-
Эксудат. плеврит	1	3	-
Инфильтративный т-з	9	3	-
Первичный комплекс	1	-	-
Туберк. периф. л/узлов	1	2	-
Туберкулома	1	-	-
Инфицирован.	-	9	-
ВСЕГО:	56 53	20	1

Таким образом, как явствует из анализа приведенных цифр, отмечается выраженная тенденция к уменьшению случаев детского туберкулеза, что является результатом проведенной работы по БЦЖ-ированию новорожденных и ревакцинации детей, т. е. созданию иммунной прослойки и одновременно своевременным выявлением детского туберкулеза путем ежегодной постановки проб Манту и полноценно проведенным лечением больных и контактных с последующей диспансеризацией по месту жительства, проведением сезонных курсов химиопрофилактики.

Что касается профилактики детского туберкулеза то БЦЖ-ирование проводится всем новорожденным в роддомах, ревакцинация при отрицательной пробе Манту у детей старше 6 лет по месту жительства.

Результаты проведенной работы были доложены врачами МСФ и специалистами РПТД на семинаре в г.Гагра 29-31.04.2001г., были приглашены также специалисты фтизиатры НИИ туберкулеза г. Москвы, а также широкий круг врачей всех регионов республики.